

EXAMENS DES YEUX

Définitions

- La rétinopathie du prématuré (RDP) est une affection oculaire potentiellement aveuglante qui touche les enfants prématurés. La RDP survient lorsque des vaisseaux sanguins anormaux se développent et se propagent dans la rétine, ce qui peut entraîner un décollement de la rétine. La RDP est classée en cinq stades allant du stade léger 1 au stade sévère 5.

Points clés

- Population cible
 - Bébés < 1250 gr ou < 30 6/7 semaines d'âge gestationnel (AG)
 - Les bébés instables ou ceux que le médecin considère comme étant à risque
- Examen de planification
 - Pour les bébés âgés de 22 à 27 semaines d'AG à la naissance : à 31 semaines
 - Pour les bébés de 28 à 32 semaines d'AG à la naissance : Après 4 semaines
 - Les examens de la vue sont prévus tous les **mardis** à 8h30 avec l'Ophtalmologie.

Procédure

o Matériel

- Sacs préparés par l'infirmière auxiliaire **LE LUNDI** (tout est stocké dans la boîte blanche dans le bureau des assistantes gérantes dans l'armoire du haut).

- 1 spéculum
- 1 dépresseur
- Tétracaïne et sucrose
- Des fioles 'squirts' roses de saline normale
- 1 gaze stérile 2x2

o Comment ?

- Le NNP Philippe Lamer envoie par e-mail la liste des bébés prévus pour chaque semaine en fonction de critères. La liste est disponible sur l'icône de raccourci de l'ordinateur sur le bureau RNA-G (sur les ordinateurs de la laiterie et de l'alcôve de la salle 25)
- Imprimer la liste des noms et la placer sur le tableau des examens de la vue.
- Remplir le formulaire de consultation médicale pour chaque bébé (uniquement pour le premier examen ophtalmologique), signé par le médecin.
- Récupérer la commande de gouttes pour les yeux dans le dossier du patient et la remettre à la pharmacie **le lundi avant 16h00**.
- La commande de gouttes oculaires doit être signalée dans le dossier - inscrire l'heure de dilatation des yeux dans le dossier. L'infirmière donne les gouttes 60 minutes avant l'examen oculaire et la deuxième dose dans chaque œil 5 minutes après la première dose (habituellement 07:30).
- Placer une goutte de Tétracaïne dans chaque œil immédiatement avant l'examen.
- Lavez-vous les mains et positionner le bébé pour l'examen et maintenez-le en place si nécessaire.
- Récupérer les spéculums et les abaisseurs sales (kits) et les apporter au 3e étage C03 3003 pour qu'ils soient nettoyés et stérilisés (poste MDRD, téléphone 43744).
- Toujours noter la quantité de kits sur la feuille d'instruments du POR (classeur violet du POR) ainsi que la date, l'heure et le nom de la personne à qui ils ont été remis afin de pouvoir les réutiliser à l'avenir.
- Récupérer les kits RDP stérilisés du MDRD C03 3217 le mercredi et noter la quantité récupérée. Placer les kits propres dans la boîte blanche dans le bureau des assistantes gérantes B06 2843 dans l'armoire du haut.

*Noter qu'il y a 16 jeux de spéculums et d'abaisseurs et qu'ils sont très chers et ne doivent pas être prêtés à l'ophtalmologie ou à d'autres services.