

PATIENT SE RENDANT À DES EXAMENS

IRM/RI/Vidéofluoroscopie/Écho

Indications

- Transporter les patients en toute sécurité vers des tests ou des interventions à l'extérieur de l'USIN (IRM, insertion de PICC, etc.)
- S'assurer que les tests et les procédures peuvent être effectués en toute sécurité

Points clés

- **Pour l'IRM seulement** : Pour les patients sous perfusion de médicaments, la tubulure d'IRM doit être amorcée et ajoutée au système lors des changements de TPN/seringue de **la veille** du test. Idéalement, **une seule** tubulure IRM devrait être ajoutée, et cette tubulure devrait être ajoutée aussi près que possible du patient (entre le Trois voies et le patient). Pour que le patient reçoive des doses adéquates de perfusions, cette configuration doit fonctionner pendant **au moins** une heure avant de se fixer au patient.
- Pensez à la sédation et à la gestion de la douleur pour tous les patients nécessitant un test ou une intervention.
- Certaines méthodes de sédation (c.-à-d. l'hydrate de chloral) ont besoin de temps pour faire effet, alors tenez-en compte lorsque vous planifiez l'administration d'une dose.
- Assurez-vous que votre bébé porte son bracelet d'identification.
- Un stéthoscope, le dossier du bébé et un réservoir d'O₂ avec sac et masque de ventilation sont nécessaires pour chaque transport hors de l'unité.
- Les patients doivent partir pour les tests avec le strict minimum dans leurs isolettes ou leurs bassinette (pas de jouets, de couvertures supplémentaires, etc.)
- Même lorsque l'infirmière de transport ou de réanimation emmène le bébé pour un test ou une intervention, il est de la responsabilité de l'infirmière de chevet de préparer le patient à temps.
- Si le patient est sous assistance respiratoire ou a des difficultés respiratoires, coordonner avec l'inhalothérapeute.

Procédure

- **Pour l'IRM** (patients n'étant pas sur hypothermie thérapeutique)

Comment préparer le bébé	Quel équipement pour se préparer
→ Sédation si nécessaire	➤ Réservoir d'O ₂ avec sac et masque
→ Nourrissez bébé au moins une heure avant le test afin qu'il dorme	➤ Oreiller IRM avec 2 taies d'oreiller
→ Retirer le pyjama et les électrodes cardiaques (sauf si bébé est instable, alors retirer les juste avant le test)	➤ Bouchons IRM et couvre-oreilles
→ Suce, sucrose	➤ Si le bébé a des perfusions ou des TPN, une longue tubulure IRM spéciale doit être amorcée et fixée au patient avant que le patient ne parte pour le test.
→ Retirez les mobiles, les jouets, les couettes, etc. du berceau du bébé – minimisez l'encombrement	

- **Pour la radiologie interventionnelle** (c.-à-d. insertion de ligne PICC, insertion de bouton NJ etc.)

Comment préparer le bébé	Quel équipement pour se préparer
<ul style="list-style-type: none"> → Sédation et gestion de la douleur si nécessaire → Suce et sucrose → Retirer le pyjama (couvrir avec une couverture d'hôpital blanche pour garder au chaud) → Retirer les mobiles, les jouets, les couettes, etc. du berceau du bébé → Si le patient est amené en isolette, assurez-vous que l'isolette se préchauffe pour après le test 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réservoir d'O2 avec sac et masque ➤ Si le patient a un drain (Replugle, drain thoracique, etc.) sur suction murale, vérifiez auprès de l'équipe médicale si s'il faut maintenir l'aspiration ou passer au drainage libre pour le test. Apportez TOUJOURS une pince hémostatique avec vous pour les tubes thoraciques (en cas de déconnexion accidentelle). ➤ Si l'aspiration doit être maintenue, procurez-vous une machine d'aspiration portable auprès d'une infirmière de transport ➤ Apportez des tubes d'aspiration supplémentaires avec des connecteurs

- **Pour la vidéofluoroscopie/écho** (p. ex. Insertion NJ, gastroscopie, suivi de l'intestin grêle, vidéo de déglutition, écho cardiaque, etc.)

Comment préparer le bébé	Quel équipement pour se préparer
<ul style="list-style-type: none"> → Suce et sucrose → Lait si le patient n'est pas NPO pour le test (par exemple, pour l'écho cardiaque) → Retirer le pyjama (couvrir avec une couverture d'hôpital blanche pour garder au chaud) → Retirer les mobiles, les jouets, les couettes, etc. du berceau du bébé → Si le patient est amené en isolette, assurez-vous que l'isolette se préchauffe après le test 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Réservoir d'O2 avec sac et masque ➤ Les parents peuvent accompagner et être présents au chevet du patient pour ce test s'ils le souhaitent