



Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

HÉMA-QUÉBEC

CRITÈRES D'ALIMENTATION POUR LE LAIT MATERNEL MIS EN BANQUE EN FONCTION DES NIVEAUX D'INVENTAIRE D'HÉMA-QUÉBEC

CRITÈRES	-ROUGE-	-ORANGE-	-JAUNE-	-VERT-
CRITÈRES INCLUSION: ÂGE ET POIDS	Moins de 29 semaines <i>(28 6/7 et moins)</i> OU < 1000g	Moins de 30 semaines <i>(29 6/7 et moins)</i> OU < 1300g	Moins de 31 semaines <i>(30 6/7 et moins)</i> OU < 1500g	Moins de 32 semaines <i>(31 6/7 et moins)</i> OU < 1750g
DURÉE: ÂGE ET POIDS	Jusqu'à: 32 semaines OU 2000g	Jusqu'à: 32 semaines OU 2000g	Jusqu'à: 33 semaines d'âge corrigé OU 2000g OU Arrêtez avant selon l'équipe de traitement	Jusqu'à: 34 semaines d'âge corrigé OU 2000g OU Arrêtez avant selon l'équipe de traitement
NEC	- Réalimentation post-NEC stade 2 ou plus - Pendant 2 semaines une fois FPO	- Réalimentation post-NEC stade 2 ou plus - Pendant 2 semaines une fois FPO	- Réalimentation post-NEC ou Entérite grave (grade 2 ou plus) - Pendant 2 semaines une fois FPO	- Réalimentation post-NEC ou Entérite grave (grade 2 ou plus) - - Pendant 3 semaines une fois FPO
POST-CHIRURGICAL INTESTINAL PATHOLOGIE	N/A	N/A	- Post omphalocèle, gastroschisis, volvulus, hernie diaphragmatique, intestin court - -Pendant 2 semaines une fois FPO	- Post omphalocèle, gastroschisis, Volvulus, diaphragmatique hernie diaphragmatique, intestin court - - Pendant 3 semaines une fois FPO
MÉDICAL INTESTINAL PATHOLOGIE ET AUTRES PATHOLOGIES	N/A	N/A	- Malformation cardiaque importante - Pendant 2 semaines une fois FPO	- Malformation cardiaque importante - Pendant 3 semaines une fois FPO - Pendant le refroidissement, arrêter une fois réchauffer.

LE LAIT MATERNEL MIS EN BANQUE EST DONNÉ POUR REMPLACER OU COMPLÉTER LE LAIT MATERNEL DE LA MÈRE DE L'ENFANT